


Геомицин® Ф

**Эффективная профилактика
и терапия внутриматочных инфекций**



**Профилактика и лечение послеродового эндометрита
и других воспалительных заболеваний матки у коров.**

Действующее вещество: окситетрациклина гидрохлорид 1,0 г.

Таблетки Геомицин® Ф при контакте с экссудатом матки образуют обильную пену, содержащую значительное количество двуокиси углерода, что обеспечивает:

- Распределение окситетрациклина по всей поверхности органа
- Проникновение в более глубокие слои слизистой
- Механическое очищение поверхности эндометрия
- Повышение тонуса миометрия
- Стимуляцию сократительной способности матки

Геомицин® Ф

Пенообразующие таблетки
для внутриматочного применения



Регистрационное свидетельство 191-3-7.15-2775
№ ПВИ-3-3.0/03137



СОСТАВ

Геомицин® Ф в 1 таблетке (19 г) в качестве действующего вещества содержится: окситетрациклина гидрохлорида — 1,0 г, а в качестве вспомогательных веществ: виннокислотная кислота — 6,5 г, углекислый натрий — 7 г, желатин — 0,5 г, стеарат магния — 0,125 г, тальк — 0,75 г, полиоксиэтиленцетил эфир — 0,075 г, кокосовое масло — 0,008 г и кукурузный крахмал — до 19 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Геомицин® Ф — антибактериальный лекарственный препарат тетрациклиновой группы.

Окситетрациклина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, относится к антибиотикам тетрациклинового ряда, механизм действия которого заключается в подавлении синтеза белка на рибосомах бактериальных клеток.

Окситетрациклина гидрохлорид обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стрептококков, стафилококков, эшерихий, сальмонелл, клебацилл, актинобактерий, а также некоторых видов микоплазм, риккетсий, хламидий и простейших.

ПОКАЗАНИЯ

Геомицин® Ф назначают для лечения и профилактики болезней бактериальной этиологии матки у коров после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, послеродового эндометрита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Геомицин® Ф применяют внутриматочно. Перед введением лекарственного препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста и проводят легкий массаж матки в течение 1–2 минут. При необходимости, перед введением лекарственного препарата полость матки освобождают от гнойного экссудата (при пиометре, гнойных и гнойно-катаральных эндометритах).

С профилактической целью Геомицин® Ф вводят однократно или двукратно (с интервалом 24 часа), в дозе 1 таблетка на животное.

С лечебной целью Геомицин® Ф вводят в течение 3–5 суток с интервалом 24 часа в дозе 1–2 таблетки на животное.

ФОРМА ВЫПУСКА

Упаковка по 10 таблеток

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Genera Inc., Svetonedjelska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Хорватия



Официальный дистрибьютор в России — ООО «Симедика РУ»
тел. +7 (495) 9430067 • www.cymedica.com